

# Leptoceratops

Steckbrief / Datenblatt

<b>Name</b>	<b>Übersetzung:</b> Leptoceratops heißt „schlankes Horngesicht“ <b>Betonung:</b> LEP-to-ZE-ra-tops <b>benannt durch:</b> Barnum Brown <b>zeitlich benannt:</b> 1914
<b>Größe</b>	<b>Länge:</b> 2 Meter <b>Höhe:</b> 0,8 Meter <b>Gewicht:</b> 70 Kilogramm
<b>Lebensraum</b>	Waldgebiete
<b>Nahrung</b>	<b>Herbivore</b> (Pflanzenfresser) - fraß vermutlich niedrig wachsende Pflanzen
<b>Zeit</b>	<b>Späte Kreidezeit</b> (Maastricht) von vor 68 bis vor 65 Millionen Jahren
<b>Ort</b>	Fossilien wurden in <b>Nordamerika</b> gefunden: Kanada (Alberta), USA (Wyoming), vielleicht Australien
<b>Fossilien</b>	3 komplette Schädel, 2 unvollständige Schädel, einzelne Skelette
<b>Klassifikation</b>	<b>Reich:</b> Animalia (Tiere) <b>Stamm:</b> Chordata (Wirbeltiere) <b>Klasse:</b> Reptilia (Echsen) <b>Ordnung:</b> Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) <b>Familie:</b> Ceratopsia (gehörnte Dinosaurier mit Nackenschild und Papageienschnabel) <b>Gattung:</b> Leptoceratops <b>Arten:</b> <i>gracilis</i> (Brown, 1914)
<b>Interessante Einzelheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leptoceratops besaß viele Merkmal von frühen, primitiven Ceratopsiern, lebte aber erst am Ende der Kreidezeit.</li> <li>• Er hatte nur einen kleinen Nackenschild und einen flachen Höcker auf der Nase, aber keine Hörner.</li> <li>• An den Händen besaß Leptoceratops fünf Finger, mit denen er beim Fressen möglicherweise Zweige an das Maul heranzog.</li> </ul>

(Letzte Aktualisierung: Nov. 2008)